

# Notick

Use Veterinário

## Carrapaticida, Sarnicida e Piolhicida

### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Amirtraz ..... 12,5 g

Veículo q.s.p ..... 100,000 mL

### Indicações:

Em **bovinos**, tratamento e controle das infestações por carrapatos (*Boophilus microplus*, *Amblyomma spp.*, *Anocentor spp.*, etc.) e sarnas (*Sarcoptes scabiei* var. *Bovis*, *Sarcoptes communis*, var. *bovis*, *Chorioptes bovis*).

Em **caprinos**, tratamento e controle das principais sarnas (*Sarcoptes spp.*, *Psoroptes spp.*).

Em **ovinos**, tratamento e controle das sarnas (*Psoroptes communis* var. *ovis*) e piolhos (*Linognathus spp.*, *Damalinea spp.*, *Melophagus spp.*, etc.).

Em **suínos**, tratamento e controle dos piolhos (*Haematopinus suis*), sarnas (*Sarcoptes scabiei* var. *suis*).

Em **cães** tratamento e controle das sarnas demodéica, sarcóptica e notodéica (*Demodex canis* e *Sarcoptes scabiei*, *Notodres spp.*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e piolhos (*Trichodectes spp.*).

### Posologia:

Para Bovinos:

Diluir 40 mL de **Notick** em 20 Litros de água, ou seja, 2 mL para cada Litro de água.

Para Ovinos, Caprinos e Suínos:

Diluir 80 mL de **Notick** em 20 Litros de água, ou seja, o dobro da dose recomendada para bovinos.

Bovinos		Caprinos, Ovinos e Suínos	
Notick (mL)	Água (litros)	Notick (mL)	Água (litros)
40	20	40	10
80	40	80	20
100	50	100	25
200	100	200	50
500	250	500	125
1000	500	1000	250
2000	1000	2000	500

### Para Cães:

- Sarna demodéica e sarcóptica: diluir 4 mL de **Notick** para cada 1 Litro de água.

- Carrapatos e piolhos: diluir 2 mL de **Notick** para cada 1 Litro de água.

### Modo de usar:

Diluir o produto somente no momento da aplicação e não estocar a calda. Se utilizar pulverizador manual ou

automático tomar cuidado para que o jato tenha bastante pressão e penetre sob o pelo do animal. Assegurar-se que todas as partes do animal (inclusive as axilas, cauda, interior das orelhas, etc) sejam bastante molhadas.

### Em Cães:

-**Sarnas demodéicas e sarcópticas:**

Recomenda-se um banho com água e sabão

neutro, antes da aplicação de **Notick**, para retirada de sujeiras e crostas. Após o banho, secar o animal e, com o pelo seco, aplicar a solução esfregando bem para que o produto penetre através dos pelos. Durante a aplicação do produto, cuidar para que o animal não se lamba.

Deixar o animal secar naturalmente, em local abrigado do frio e calor.

### -Carrapatos:

Banhar o animal com o produto preparado, não havendo a necessidade de banho prévio, exceto em casos em que o animal esteja extremamente sujo. Em cães de pelos longos e muito embaraçados uma tosa é recomendada.

Retirar o excesso de produto com uma toalha ou pano limpo e deixar secar naturalmente. Não utilizar secador nesta etapa.

Realizar junto com o tratamento do animal o tratamento do ambiente em que ele vive, lavando cuidadosamente a casinha ou canil, trocar a cama do animal, roupas, panos, cobertores, etc. Neste caso, recomenda-se a diluição de 2 mL de Notick por Litro de água para pulverização das paredes, pisos, frestas, telhados e outros locais que possam servir de abrigo a estes parasitos.

### Intervalo entre as aplicações:

-**Sarnas demodéicas e sarcópticas**

Repetir o tratamento em intervalos semanais, até o desaparecimento das lesões ou a critério do Médico Veterinário.

### -Carrapatos:

Repetir o tratamento sempre que necessário ou conforme recomendação do Médico Veterinário responsável.

### Precauções:

Para bovinos, ovinos, caprinos e suínos:

-Não tratar animais cansados ou nas horas mais quentes do dia, ou ainda, em dias chuvosos.

-Não tratar animais em adiantada fase de gestação.

-As áreas atingidas, no aplicador, pelo produto devem ser lavadas várias vezes com água e sabão em abundância.

-Não pulverizar os animais contra o vento e nem utilizar pulverizadores com vazamento.

### Para Cães:

O tratamento de cadelas prenhes, em lactação ou filhotes com menos de 4 meses de idade não é recomendado e, quando necessário, deve ser criteriosamente avaliado pelo Médico Veterinário responsável.

### Atenção:

-Não reutilizar as embalagens vazias para quaisquer fins.

-Utilizar luvas impermeáveis para tratamento dos animais, evitando o contato do produto com a pele. Caso isto ocorra, lavar abundantemente com água e sabão.

-Não exercitar o animal antes da aplicação e oferecer bastante água.

" ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA":  
BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.  
LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 48 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

-Evitar o contato do produto com os olhos e evitar que o mesmo seja ingerido pelo animal.

-Aplicar o produto à sombra, com o pelo seco, em caso de banho prévio secar bem a pelagem antes do tratamento.

-Preparar a diluição somente no momento da aplicação.

-Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos e ao abrigo do fogo.

-Manter o produto em local seco, fresco (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz solar.

-Para evitar reinfestações e controlar efetivamente estes parasitos é importante realizar o tratamento do ambiente onde vivem os cães, usando produtos adequados para este fim.

-Em caso de suspeita de intoxicação procure um Médico imediatamente. Nos casos de ingestão acidental, provocar vômito, administrando por via oral uma colher de sopa de sal comum, dissolvida em um copo de água morna.

-Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto.

### Antídoto e tratamento:

Não se conhece antídoto específico para o Amirtraz. Sinais clínicos tais como depressão no sistema nervoso central, depressão respiratória, hipertensão, distúrbios digestivos, cefaléia, tremores, agitação e convulsões podem ser indicativos de intoxicação por formamidas. O tratamento deve ser analéptico sintomático.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do Médico Veterinário

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 9.497 em 21/12/94

### Responsável Técnico:

Dra. Larissa Arantes Mendonça CRF-SP 53482

Prazo de validade: 2 (dois) anos após a data da fabricação

Apresentação: frascos de vidro âmbar contendo 20 mL, 500 mL e 1000 mL e frasco plástico contendo 200 mL. Display contendo 15 frascos com 20 mL cada.

### Proprietário e Fabricante:



**centagro**

Centagro - Centro Tecnológico Agropecuário Ltda.

Rua Prudente de Moraes, 157 - Batatas - SP

CEP 14300-000 Fone: (16) 3660-3300

www.centagro.com.br

CNPJ: 23.793.946/0001-58

Indústria Brasileira

**S.A.C.**  
08009410060

